


BOLETIN DE EXTENSION N° 6


ADMINISTRACION DE VACUNAS EN EL AGUA
INSTRUCCIONES GENERALES

1. NO exponga la vacuna a la luz del sol.
2. Descontinúe todo desinfectante en el agua 24 horas antes de la vacunación.
3. Lave el equipo con agua limpia.
4. Suspnda el agua 2-3 horas antes para estimular la sed las aves.
5. Reconstituya la vacuna correctamente.
6. Use siempre la dosis correcta por ave.
7. La cantidad de agua a utilizar para preparar la vacuna depende de la edad de las aves y tipo de la vacuna. SEÑOR AVICULTOR, TIENE QUE SEGUIR CORRECTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DE LA VACUNA.
8. Para mejor preservación del virus, agregue 35 gramos de leche en polvo por cada 20 litros de agua o 10 cucharadas pequeñas (dulceras) de leche descremada por cada 20 litros de agua.
9. Mezcle la vacuna en un recipiente pequeño (3-4 litros), antes de adicionar el agua total.
10. Vacune de ser posible todas las aves de un galpón el mismo día.
11. Ponga suficientes bebederos para que al menos dos tercios (2/3) de las aves puedan beber a un mismo tiempo.
12. Destruya el material sobrante (frascos de vacunas) por medio del calor.

RECUERDE SEÑOR AVICULTOR QUE HAY VIRUS COMO EL DE NEWCASTLE QUE INFECTA A LOS HUMANOS, SI NO SE TIENEN LOS CUIDADOS NECESARIOS. MANEJE BIEN LA VACUNA.



Dr. Gilberto Tonesaca
Jefe Programa de Avicultura INIAP



Dr. Gustavo Morales
Colaborador Técnico INIAP-SIDA