



EL CANIBALISMO EN LAS AVES

Señor Avicultor:

Hoy vamos a referirnos brevemente a un problema que puede tomar grandes proporciones si no se toman las medidas necesarias, como es el canibalismo.

Este vicio es bastante común en las aves, pudiendo comenzar durante la cría, trasladándose a los galpones de postura.

Los factores a continuación se enumeran, puede constituirse, en determinado momento, causas de canibalismo:

1. Nutrición pobre
2. Alta densidad poblacional
3. Demasiado calor
4. Falta de alimento y agua.

En algunos casos, el canibalismo se presenta en planteles bien manejados en donde no existen causas aparentes de "stress" para las aves.

La administración de raciones mal balanceadas en proteína, energía, fibra bruta, sales minerales y vitaminas pueden desencadenar brotes de canibalismo; así, raciones pobres en metionina, sal o fibra bruta parecen ser las causas más frecuentes para que aparezca el canibalismo.

Igualmente, un mal manejo de la parvada que resulte de una alta densidad poblacional, disminución del espacio de comederos y bebederos, mala ubicación de los mismos, un aumento de la temperatura del galpón por la aglomeración, luz excesiva, mala ventilación de los galpones, también son causas que predisponen a las aves a mostrar signos de canibalismo.

Los métodos de control, cuando un brote de canibalismo se hace presente, contempla la identificación del o los factores que más influyen para que el problema aparezca y se deberá actuar en forma directa sobre los mismos a fin de corregir y controlar el canibalismo.

Para conocer más de esta afección, consulte a su médico veterinario o al nutricionista.

Gustavo Morales
ASESOR TECNICO

Julio Toasa
TECNICO DEL PROGRAMA

Gilberto Tenesaca
JEFE DEL PROGRAMA

CdeA.