



PORCENTAJE DE PROTEINA EN DIETAS DE PONEDORAS
Y POLLOS PARRILLEROS

Estimado Avicultor:

En cartas avícolas anteriores nos referíamos a la energía necesaria en las dietas para ponedoras y pollos parrilleros, según se encontraran las aves en un clima cálido o frío. Se decía que la relación proteína/energía que debe existir en la dieta es muy importante si queremos tener una buena conversión, tanto para la producción de huevos como para carne.

Siendo la proteína o las fuentes proteicas las más costosas en las diferentes dietas, durante las diferentes fases productivas de ponedoras y pollos parrilleros, es importante entonces que tengamos una idea general del porcentaje de proteína necesaria en las dietas que tenemos que manejar si tenemos una explotación tipo comercial y estamos preparando nuestro propio alimento.

EN PONEDORAS TENEMOS		EN PARRILLEROS TENEMOS	
EDAD SEMANAS	°/o PROTEINA EN LA DIETA	EDAD SEMANAS	°/o PROTEINA EN LA DIETA
0 - 8	20	0 - 4	22
8 - 12	17	5 - 7	20
12 - 22	14	7 - 8	18
22 - 72	17		

En ponedoras, cuando se llega aproximadamente a los 4 meses de producción, se puede reducir el nivel de proteína en la dieta de postura a 16°/o. Cuando las ponedoras llegan a una producción inferior al 60 - 65°/o, se puede reducir aún más el porcentaje de proteína, el cual puede ser de 14°/o.

Estos datos señor avicultor, nos ayudan a reducir costos en la preparación de balanceados, también es importante tener en cuenta, que a las aves hay que no solamente darles los niveles de proteína adecuados sino también proteína de buena calidad. De esto último hablaremos más tarde.

Si bien es cierto que el conocimiento de los niveles necesarios de proteína en las dietas durante las diferentes fases productivas de las aves es necesario para abaratar costos de producción, los avicultores que tienen pocas aves (500 o 1.000) y tratando de ser prácticas en el medio nuestro, teniendo en cuenta la dificultad de preparar correctamente los balanceados en áreas rurales a nivel de pequeño y mediano avicultor, deberían utilizar para postura una sola dieta con un contenido standar de proteína del 16 al 17°/o. Para pollos parrilleros este podría ser del 18 al 20°/o de proteína.

Gustavo Morales
ASESOR TECNICO

Víctor Gutiérrez
TECNICO DEL PROGRAMA

Gilberto Tenesaca
JEFE DEL PROGRAMA

CdeA.