




PODA DE FORMACIÓN EN EL CULTIVO DE GRANADILLA!

Esta práctica fomenta un crecimiento rápido y ordenado de los órganos vegetativos y productivos de la planta para que esta ocupe el espacio asignado en el diseño del huerto. Así se mantiene un estado fitosanitario óptimo y se consiguen cosechas de calidad.


PODA DE FORMACIÓN DEL EJE PRINCIPAL

Este tipo de poda consiste en la formación de la planta a partir de **un solo tallo o eje principal**. Debe realizarse cuando la planta está en etapa vegetativa o a 180 días después de la plantación.

Se debe dejar un solo tallo principal que sobrepase la altura del tendal. Sobre las 8 a 10 yemas potenciales, se despunta, permitiendo que se generen de 4 a 6 ramas primarias. Estas ramas se denominan **"madera estructural"**.



1



2

Las ramas primarias se dejan crecer entre 10 y 12 yemas, y también son despuntadas para estimular el desarrollo de ramas secundarias. Estas se consideran ramas cargadoras de grado medio, y son las responsables de la primera cosecha.

3

Cuando las ramas secundarias han alcanzado una longitud de 1,5 m son despuntadas para formar las ramas terciarias, las cuales crecen libremente hasta llenar el espacio asignado a la planta, según las distancias de plantación y el diseño del huerto. Estas ramas generan la cosecha principal del cultivo.

NOTAS:

- El tallo principal debe ser conducido de forma perpendicular al suelo, mediante el uso de tutores individuales (alfajías ≈ 1m) y piola de amarre. Se deben eliminar todos los brotes y conservar las hojas para proteger del golpe de sol.
- Todo corte de poda superior a 1 cm de diámetro debe ser sellado con una pasta que incluya un fungicida cúprico (caldo bordelés 80%). Para cortes de menor diámetro, se deben hacer aspersiones con fungicidas del mismo tipo.