



INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS  
PROGRAMA DE AVICULTURA

CARTA AVICOLA



Fecha: Enero de 1982

No.: 25

CONTROL DEL CANIBALISMO

En una carta anterior se describió las principales causas para el apareamiento de canibalismo. En la presente veremos los métodos de control más recomendados.

Cuando se presente un brote de canibalismo se deben examinar cuidadosamente cada uno de los factores, a fin de determinar cual es el que más está afectando y poder actuar a tiempo para corregir el problema.

En aves de postura esta alteración se puede corregir empleando un sinnúmero de medidas:

Antes se utilizaba salvapicos que consistía en colocar en lo alto del pico gafas plásticas de color y/o un salvapicos de extremidad redondeada que permite la libre alimentación e impedía al ave que pueda causar daño a sus compañeras, esta medida también se acompañaba con la utilización de ventanales pintados con colores oscuros, como el verde y el rojo.

Otra medida bastante difundida era la aplicación de alquitrán de pino u otros productos que tuvieran un olor y sabor desagradables, en las heridas de las aves afectadas.

En la actualidad se recomienda el suministro de sal, aumentando hasta un 0.4% del total de la ración, es una medida que, por lo general, detiene rápidamente el canibalismo, debiendo, en algunos casos, continuar el aumento de sal por tres o cuatro días; sin embargo, es necesario recordar que la administración de dietas ricas en sal por períodos prolongados puede causar intoxicación.

Igualmente la administración en la dieta de un 5% de avena en grano tiende a controlar el canibalismo, pues este alimento parece poseer un factor que inhibe esta afección.

La administración de sustancias que en el mercado se conocen como antiestresantes, también disminuyen el estado de tensión que se observa en el canibalismo.

El método más drástico, que por lo general es el más aconsejable, consiste en cortar el pico con la ayuda de un cuchilla incandescente (de preferencia eléctrica) el 1/3 del pico superior y algo del inferior, tratando siempre de que el inferior quede algo más largo que el superior. Aunque algunas casas comerciales venden aves despizadas al primer día de nacidas, por lo general se recomienda realizar el corte de pico entre el sexto y décimo día y un segundo despique entre la décimocuarta y décimasexta semanas o realizar un solo despique entre la décimasegunda a décimasexta semanas.

En pollos parrilleros se aconseja despigar únicamente cuando el problema del canibalismo se hace presente.

Recuerde determinar con exactitud cual es el factor que produce el problema para actuar sobre él y eliminar la afección.

Atentamente,

Dr. JULIO TOASA

Dr. GILBERTO TENESACA

Dr. GUSTAVO MORALES

CdeA.